27. 9bre. 1760.

# observation donnée par le

Sieur Liteux Mtre. en chirurgie demt. a
anguien les paris au sujet d'une posche membraneuse
tres Solide contenant trois aquatres pintes d'eau
grande Mesure renfermée dans le bas ventre, en
occupant la plus grande partie flottante Sur les
intestins et en laquelle Sest trouvé divers corps
Etrangers differemmt. figurés et Solides contenus
dans Linterieur de ladite posche et au centre d'un
replis partie membraneux graisseux carcinomateux
Separant icelle posche en deux principalles.
dans les paisseur duquel replis et a travers un Kiste
qui contenoit un corps Etranger oblond Solide.
Etoit pratiqué un conduit plus ou moins Etendu
qui avoit une Entrée et une Sortie dilatée en forme
de Sphincter qui communiquoit l'eau d'une posche
a lautre.

1760 Trouvés dans le Cadavre d'un homme mort Subitement

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 25 d. 92

En ouvrant le Cadavre d'un homme agée d'environ 64 ans gras Sanguin bien portans connu pour imbecille pensionn.re chez M.rs les matthurins de cette ville depuis quelques années. Icelui mort Subitem.t la nuit du 23 au 24.e octobre de la presente année.
La veille ayant tres bien Soupée et avoir Ensuitte rejettée en divers Endroits les nourritures et Boissons quil avoit pris jmmoderement en qui vray Semblablement ou par jndisposition luy avoient occasionnée une jndigestion compliquée de Nauzées vomissemens coliques foiblesses &c. pour lesquels cas n'ayant pas Estée Secouru il a paru Evident que sa mort precipitée en avoit derivée. En eque le vingt quatre dud mois et an ayant Estée appellée le matin et aussytost quon sen fut apperçu pour faire linspection et louverture du Cadavre. Je trouvai le Sujet encore partie chaud point changé ny defiguré Etendu roide en partie habillé partie sur son lit partie dedans, La teste panché et tournée du Costé de la ruelle ayant les parties posterieures du col et du tronc livides parsemées de taches noires plus Etendues plus Eminentes en certains endroits du dos.

Il avoit le ventre hault Large et tres distendu la plus grande partie des jntestins que je trouvai dans les regions gauches du bas ventre Estoient rouges enflammées tendus Boursouflés d'un volume et d'une tension Extraordinaire, Lesquels aussy contraint de quils se trouvoient dans labdomen en sortirent et s'elancerent avec force des le moment que jus ouvert le costé gauche.

La portion jnferieure du colon se replia au meme temps et fit dans la region Lombaire en hors de la capacitée

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Lare en le cerceau, d'ailleurs ces jntestin Etois dans
l'etendue de plus d'un pied et demy rouges Enflammé
en d'un diametre Sensiblement contraire au naturel
Dans les regions Epigastriques et hipocondres gauche
la portion d'epiploon qui si voyoit Etoit tres court et
Epaisse gonflée d'un rouge pourpré fortement adherante
a la superficie du colon.

le Volume d'intestins hors de bas ventre auroit du
en diminuer Leminence la rotonditée la tension en la
duretée qui demeurerent neantmoins les mêmes jusqua
ce qu'ayant ouvert et separé En Entier les parties conte-
nantes communes et propres de cette capacitée J'aperçus
une Surface Elevée membraneuse tres Etendue flexible
ondulente garnie de graisse, qui occupoit et remplissoit
touttes les regions droittes et anterieures de labdomen
en qui posterieurement Se trouvoit attachée et adherante
dans un petit Espace a la membrane adipeuse du rein
droit a une portion du mezentere a loppositte du coecum
de Luretere et des Vaisseaux Emulgens ou la lesp trouvé
une masse graisseuse confondue avec des portions membra-
neuses tres compactes dans Lespaisseur desquelles Se
voyo~~ient~~ Lorifice de plusieurs Vaisseaux du calibre d'un
petit Tuyau de plume a Ecrire qui Souvroient dans le
fond de cette poche et ~~[illegible]~~ Se continuoient dans
un autre corps partie membraneux graisseux cartilagineux
qui formoit dans linterieur d'icelle une cloison ou
Separation tres forte jugale.

Les Vaisseaux que je viens de citer alloient s'y rendre
en vray semblablement Servoient a sa nourriture et
et a son accroissement

Exceptée le peu d'attache et d'adherance que j'ay dit

avoir cette pance au posche a sa partie posterieure par ou elle tiroit sa nourriture plutost a ce que jay pu remarquer de la part des vaisseaux limpfatiques que des sanguins n'en ayant paru de ces derniers aucunes distributions ny ramifications sensibles en touttes ses surfaces.

presque toutte cette posche membraneuse Etoit libre Setendant et sélevant plus ou moins sur la superficie des intestins qui en Estoient non seulement recouverts mais prassés et contraints de setandre et se jetter du costé opposé, attendu le grand Espace qu'occupoit cette posche comme aussy le poids qu'elle devoit y faire

Elle avoit la forme en le diametre d'un gros Balon, Estans d'une texture serré Epaisse la superficie remplie d'appendices graisseuses et linterieur lisse blanche polie Excepté nombre de rides ; de duplicités de colonnes membraneuses transverses obliques longitudinales qui la partageoient environ son milieu en deux chambres en chacunes desquelles ils formoient encore des Espaces de posches de cul de sacq plus ou moins grands plus ou moins profonds.

Dans la partie la plus Etendue et la plus compacte de cette cloison que jay dit Exister Environ le milieu de la posche sest trouvé pratiqué dans son Epaisseur un conduit plus ou moins long penetrant la cloison a travers un Kiste qui renfermoit le plus considerable et le plus solide des corps Etrangers dont jaurai occasion de parler dans la suitte qui y faisoit lofice de pont ; lequel conduit avoit une Entrée et une sortie dilatée et ressemblantes a un sphincter qui faisoit la communication d'une posche a lautre ce que jay fait observer lors de louverture dicelle a nombre de personnes presentes

Jentend parler des deux principalles par lequel conduit

et ouverture distiloir en sépanchoit delune dans lautre
de ces poches une Eaue Limpide Jaunatre sans
mauvaise odeur qui pour lors sest trouvée contenue
a la quantitée de trois a quatres pintes grande mesure
et laquelle liqueure comme je lay remarqué et fait
observer avant que de la vuider sépanchoit et se trans-
-mettoit delune dans lautre desdites principalles poches
en admettant pour moyen et pour raison de cette trans-
-vasion le plus ou le moins de pression qui celles en parti-
-culier pouvoient recevoit des parties qui les avoisinoient
comme aussy de la part des differentes attitudes et
mouvemens que prenoit ou faisoit le sujet lorsquil Existoit
qui devoit constament en recevoir bien de la gesne.
aussy alloit il ployé et de costée.

Dans la continuitée de ce replis ou cloison formé de
diverses parties devenues solides et aux Environs de
ce conduit formé dans lepaisseur dicelle qui y faisoit
un certain trajet, sest trouvé des Endroits sy compacts
et si durs que je les pris pour des carcinomes. curieux den
voir le centre et la nature jouvris dessus, et fus bien
Etonné dy trouver des corps durs noirs luisans piquans
ayant la figure dun rayon desperons, la base en Etoile
irregulierement ronde applatie et la circonference
radiée remplie de prolongemens aigus. deux semblables
corps a peu pres de meme grosseur figure et couleur
Existoient a peu de distance lun de lautre separement
et au centre de la cloison dans laquelle je les tiray
incrustés quils y Etoient.
Dans leur voisinage sest trouvé une Elevation qui ne
cedoit a aucune pression; jouvris dessus et je trouvai
une loge pratiquée dans lespaisseur de la susdite cloison
qui renfermoit tres Exactement un corps noiratre oblong
tres dur et solide ressemblant quand a la forme a un oeuf
doiseau ayant dune Extremitée a lautre quinze a seize

Ligneur dont s'est separé au moment qu'il fut tiré de sa
loge deux fragmens aussy durs que ce qui en est resté entier
quand aux corps Etrangers precedens en les retirant de leur
Kiste ils paroissoient etre d'une substance ferme dure.
dans la suitte en se seichant ils sont devenus poreux se sont
brisés et mis en parcelles, au moyen de quoy j'ay veu que
L'exterieur etoit fait d'une simple couche ou ecaille noire
mince moulée et appliquée sur d'autres couches grisatres
qui formoient une base ou noyau remply d'inegalitées de
pointes qui n'avoient pas plus de fermetée ni de solidité
s'etans brisés et ecrasés comme le reste.

Le dernier et le plus considerable de ces corps Etrangers
trouvés ensuitte des autres est d'une composition et d'un
assemblage plus serré plus dur approchant d'une pierre
en dont le poids s'est trouvé de 126 grains y compris les deux
portions qui s'en sont separés paroissant icelles formées de
differentes couches ou amas de matieres veinés blanchatres

Eu egard a la nature couleur consistance de ces differens
corps Etrangers il est a presumer qu'ils ont estées formées de
parties de sang de lymphe successivement sortis de quelques
vaisseaux di[illegible] corpus.

que s'etant trouvés rassemblés en certaine quantitée
dans des parties membraneuses cellulaires etroittes.
ces parties de sang et de limphe faisant corps ensemble s'y
sont durcis petrifiés et moulés differemment et conformement
a l'etroittesse des parties ou ils se trouvoient renfermés et
serrés

Lesquelles parties soit membraneuses cellulaires vascu-
-leuses sont devenues a leur tour solides epaisses carcino-
-mateuses par raport a la pression et a la duretée qu'elles
-recevoient de la part des corps ~~durs~~ compacts qu'ils contenoient.

Le sujet dans lequel ces productions Etranges se sont trouvés

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

no. 36

Lesquelles y paroissoient anciennes, peut etre meme des Lenfance y auoient elles Estées formées et occasionnée par coups chutes Efforts ou pressions violentes.

Etoit bien Sain et constitué nayant trouvé aulcune de contraire et qui pouvoit etre une des principalle cause de sa mort subite, qu'une Extreme plenitude de sang noir et Epais dans les poulmons les ventricules du coeur et dans les gros vaisseaux qui en Estoient gorgés et duquel le cours paroissoit auoir Eté suspendu et arresté par la grande et forte pression qu'avoient souffert dans le bas ~~vent~~ ventre le tronc et les distributions de laorte et de la veine cave de la part des intestins aussy gonflés et distendus quils Etoient, comme aussy de celle de cette vaste et forte poche contenante une aussy grande quantitée d'eau qui de necessitée devoit auoir fait un poids considerable sur les susdicts vaisseaux et pareillement sur leurs divisions en distributions et par la meme raison en auoir fait regorger le sang sur les parties Superieures

ouverture de cadavre.